

附件 2 (略)

附件 3 (略)

附件 4

## 说明书和标签

重组禽流感病毒 (H5+H7) 三价灭活疫苗 (H5N2 rHN5801 株+rGD59 株, H7N9 rHN7903 株) 说明书和内包装标签

(一) 重组禽流感病毒 (H5+H7) 三价灭活疫苗 (H5N2 rHN5801 株+rGD59 株, H7N9 rHN7903 株) 说明书

**兽用**

通用名 重组禽流感病毒 (H5+H7) 三价灭活疫苗 (H5N2 rHN5801 株+ rGD59 株, H7N9 rHN7903 株)

商品名

英文名 Reassortant Avian Influenza Virus (H5+H7) Trivalent Vaccine, Inactivated (H5N2 Strain rHN5801+ Strain rGD59, H7N9 Strain rHN7903)

汉语拼音 Chongzu Qinliuganbingdu (H5+H7) Sanjia Miehuoyimiao (H5N2 rHN5801 Zhu + rGD59 Zhu, H7N9 rHN7903 Zhu)

**【主要成分与含量】** 疫苗中含有灭活的 H5N2 亚型重组禽流感病毒 rHN5801 株、rGD59 株和 H7N9 亚型重组禽流感病毒 rHN7903 株。灭活后 H5 亚型 rHN5801 株和 rGD59 株鸡胚液 HA 效价为 1 : 512, H7N9 亚型 rHN7903 株鸡胚液 HA 效价为 1 : 512。

**【性状】** 乳白色均匀乳剂。

**【作用与用途】** 用于预防由 H5 亚型 2.3.4.4b 分支、2.3.4.4h 分支和 H7 亚型禽流感病毒引起的禽流感。免疫后 14 日产生免疫力, 对雏鸡、雏鸭和雏鹅一次免疫的持续期为 2 个月。

**【用法与用量】** 颈后背部皮下或肌肉注射。2~5 周龄鸡, 每只 0.3ml; 5 周龄以上鸡, 每只 0.5ml; 5 周龄以内雏鸭、雏鹅, 每只 0.5ml; 5 周龄以上鸭、鹅, 每只 1.0ml; 种鸡、种鸭、种鹅, 建议开产前加强免疫 2 次。

**【注意事项】** (1) 本品不能冻结保存。

(2) 疫苗使用前应充分摇匀, 并使疫苗升至室温。

(3) 如果疫苗出现明显的水、油分层, 应废弃不予使用。疫苗久置, 在表面有少量白油, 经振荡混匀后不影响使用。

(4) 接种后一般无明显不良反应, 有的在接种后 1~2 日内可能有减食现象。

(5) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

(6) 上市前 28 日内禁止使用。

**【规格】**

**【包装】**

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存，有效期为 12 个月。

**【批准文号】**

**【生产企业】**

**仅在兽医指导下使用**

(二)重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N2 rHN5801 株+rGD59 株, H7N9 rHN7903 株)内包装标签

**兽用**

**重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N2 rHN5801 株+rGD59 株, H7N9 rHN7903 株)**

批准文号:

批 号:

有效期至:

**【作用与用途】** 用于预防由 H5 亚型 2.3.4.4b 分支、2.3.4.4h 分支和 H7 亚型禽流感病毒引起的禽流感。免疫后 14 日产生免疫力，对雏鸡、雏鸭和雏鹅一次免疫的持续期为 2 个月。

**【用法与用量】** 颈后背部皮下或肌肉注射。2~5 周龄鸡，每只 0.3ml；5 周龄以上鸡，每只 0.5ml；5 周龄以内雏鸭、雏鹅，每只 0.5ml；5 周龄以上鸭、鹅，每只 1.0ml；种鸡、种鸭、种鹅，建议开产前加强免疫 2 次。

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存，有效期为 12 个月。

**【生产企业】**

**仅在兽医指导下使用**